

Стратифікація пацієнтів з інфекційними захворюваннями із врахуванням ризику наявності мікроорганізмів з антимікробною резистентністю (MAMP) та інвазивного кандидозу

Пацієнт	Тип I	Тип II	Тип IIIa	Тип IIIb	Тип IV
Характер інфекції	Негоспітальна	Негоспітальна з факторами ризику щодо наявності мікроорганізмів pESBL	Нозокоміальна без факторів ризику щодо наявності мікроорганізмів pESBL	Нозокоміальна з факторами ризику щодо наявності мікроорганізмів pESBL	Нозокоміальна з факторами ризику щодо наявності інвазивного кандидозу
Звернення за медичною допомогою або госпіталізація	Відсутні звернення за медичною допомогою в останні 3 місяці	Звернення за медичною допомогою (денний стаціонар, гемодіаліз (тривалістю понад 30 днів), перебування в закладах довготривалого догляду) або госпіталізація тривалістю понад 48 годин протягом останніх 3 місяців.	Тривалість перебування в стаціонарі 7 і менше днів (поза BAPIT), відсутність оперативних втручань	Тривалість перебування в стаціонарі більше 7 днів (у BAPIT більше 3 днів) або IOXB	Пацієнти III типу з підвищенням температури тіла вище 38°C більше 6 днів, яке зберігається на фоні антибіотикотерапії, і санованим первинним афектом при наявності наступних факторів: <ol style="list-style-type: none"> розповсюджена (два і більше локусів) колонізація <i>Candida spp.</i> наявність двох і більше факторів ризику інвазивного кандидозу: <ul style="list-style-type: none"> в/в катетер; лапаротомія; повне парентеральне харчування; застосування глюкокортикоїдів або імуносупресантів
Антибіотикотерапія тривалістю більше однієї доби	Відсутність антибіотикотерапії за останні 90 діб	Попередня антибіотикотерапія протягом останніх 90 днів (з будь якої причини); попереднє лікування інфекції, яка викликана MAMP.	Не отримував антибіотикопрофілактику за останні 24 години і більше	Попередня антибіотикотерапія	
Характеристика пацієнта	Пацієнти без тяжкої супутньої патології	Тяжка супутня патологія (хронічна ниркова недостатність, цироз печінки, цукровий діабет, алкогольна вісцеропатія, наркоманія, імуносупресивний стан.)	Будь-які пацієнти	Тяжкий перебіг основного захворювання або наявність тяжкого коморбідного стану	
Додаткові фактори ризику наявності мікроорганізмів із MAMP	Відсутні	Перебування в країнах з високим рівнем MAMP (протягом останніх 90 днів).	Відсутні	Фактори ризику MRSA, <i>P.aeruginosa</i>	Попереднє лікування/профілактика азолами
Підозрювана наявність мікроорганізмів із MAMP або інфікування грибами роду <i>Candida</i>	Відсутня	Ентеробактерії-pESBL	Ентеробактерії-pESBL	Ентеробактерії-pESBL, MRSA, неферментуючі грамнегативні бактерії (<i>P.aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter spp.</i>)	Ентеробактерії-pESBL, MRSA, неферментуючі грамнегативні бактерії (<i>P.aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter spp.</i>) та <i>Candida spp.</i>

ПРИМІТКА. pESBL — продуценти β-лактамаз розширеного спектру; BAPIT — відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії; MAMP — множинна резистентність до антимікробних препаратів; MRSA — метицилінрезистентний *S. aureus*; імуносупресивний стан (вроджений імунодефіцит; прийомом хіміотерапевтичних лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань; трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин; трансплантація органів; ВІЛ-інфекція III-IV стадії; тривалий прийом глюкокортикостероїдів та/або інших лікарських засобів, які мають імуносупресивний вплив; променеве лікування).